felsaure Magnesia mit schwefelsaurem Ammoniak in Verbindung mit etwas Phosphorsäure und Kalk.

Ueber das fette Oel der Traubenkerne und über die graue Quecksilbersalbe; von Schweinsberg.

Ueber ein im Handel vorkommendes falsches Ratanhiaextract; von Reimann.

Chemische Analyse des auf Pinus Abies gewachsenen Viscum album; von Dr. Winkler. 120 Gran enthalten:

eigenthümliche flüchtige, stark riechende (ätherisch-ölige?) im Destillate wahrscheinlich mit Ammoniak verbundene Substanz, Gummi mit Spuren von Gerbestoff	4 Gran
Fettes Oel	7 —
Chlorophyll eigener Art (vielleicht größtentheils Vogelleim)	8 —
Leichtlösliches Kalisalz, Schleimzucker, Gummi mit Spuren von Gerbestoff	15 —
Schleimzucker	20 —
Faser mit Spuren von Stärkmehl	60 —

Repertorium für die Pharmacie; von Buchner. Band XXVIII.

Chemische Untersuchung der Eicheln; von Karl Löwig in Kreuznach. Bestandtheile in 1000:

Fettes Oel	43
Harz	52
Gummi	64
Eisenbläuender Gerbestoff . .	90
Bittrer Extractivstoff . . .	52

Stärkmehl 380
Faſer 319
Spuren von Kali-, Kalk- und
Alaunerdenſalzen.

Ueber Moſchus, Caſtoreum, amerikaniſche Sennesblätter; von Graßmann in Petersburg.

Zweckmäßige Art die Blutegel aufzubewahren; von Dr. Rüde.

Unterſuchung einer falſchen Ambra; von Dr. Buchner.

Chemiſche Unterſuchung von Equisetum hyemale; von C. Diebold aus Baden in der Schweiz. Beſtandtheile:

Chlorophyll;
Wachs;
gelber extractiver Farbeſtoff;
Stärkmehl, Zucker;
gallertſaurer Kalk;
Sorbusſäure und eine andere Pflanzenſäure;
Faſer.

In der Aſche ſchwefelſaures-, ſalzſ.-, kohlſ. Kali; ſchwefel-, phosphorſ.-, kohlenſ. Kalk; Eiſenoxyd. (Auf den großen Gehalt von Kieſelerde ſcheint der Verf. keine Rückſicht genommen zu haben. Vergl. Braconnot's bereits mitgetheilte Analyſe und John's Verſuche).

Bemerkungen über das künſtliche kohlenſaure Eiſenoxydul; von Pettenkofer.

Ueber die Bereitung des officinellen Eiſenmohrs und des kohlenſauren Eiſenoxyduls; von Buchner.